

الشروط الفنية للاستخدام:

مقاومة الذبابة البيضاء في الطماطم: استخدام المبيد في مراحل انتشار الذبابة البيضاء بإضافة 50 كيلو جرام ماء لكل أم يو والرش أمام وخلف أوراق المحصول بشكل متساو مع تكرار الرش كل 7 أيام أو هكذا. مقاومة حشرة قشرية الحمضيات والسليسيديد: "طظام النبات الفأفرية": استخدام المبيد في مرحلة قفص البورات وإعادة استخدام المبيد كل 15-7 يوم. يمنع استخدام المبيد أيام الرياح أو عند توقع سقوط الأمطار خلال ساعة واحدة. يجب استخدام المبيد لعدد مرتين في الفصل بالنسبة للطماطم مع فترة أمان 7 أيام. استخدام المبيد لعدد مرتين في الفصل بالنسبة لأشجار الحمضيات مع فترة امان 28 يوم.

Use technical requirements:

Control of tomato whiteflies: Apply the pesticide at the early stage of whitefly infestation, adding 50 kg of water per mu, and evenly spray the front and back of the crop leaves. Reapply the pesticide every 7 days or so. Control of citrus scale insects and psyllids: Apply the pesticide at the early stage of nymph hatching, and reapply the pesticide every 7-15 days. Do not apply the pesticide on windy days or when rain is expected within 1 hour. Use the pesticide up to twice per season on tomatoes, with a safe interval of 7 days; use the pesticide up to twice per season on citrus trees, with a safe interval of 28 days

تحذيرات

هذا المبيد سام لدودة الحبرير ويمنع استخدامه في حقول التوت أو قرب غرف دودة الحبرير. 2- مبيد سام للأسماك والحياة المائية لذا ينبغي تجنب ملامسته للمساحات المائية ويجب استخدامه بعيدا برك الجميري والسرطانات للحيلولة دون الانجراف وتلوث المياه المتناخمة. يمنع تنظيف معدات الرش في الأنهار وبرك المياه والبحيرات والمساحات المائية. 3- يمنع الاستخدام حيث يتواجد الأعداء الطبيعيين أمثال ذباب التريكوجراما 4- يسبب هذا المبيد هيجان العيون، يجب عند الاستخدام ارتداء ملابس وقفاظات واقية، يجب بعد الاستخدام مباشرة غسل اليدين والوجه، 5- يفضل تدوير الاستخدام مع مبيدات حشرية أخرى ذات أليات مختلفة، 6- عدم ملامسة للحوامل المعرضات، 7- يجب التخلص من العبوات الفارغة بشكل صحيح ويمنع استخدامه ثانية لأية أغراض أخرى

Precautions:

1. This product is toxic to silkworms. Do not use in mulberry fields or near silkworm rooms. 2. This product is toxic to fish and aquatic life. Avoid contact between the solution and water bodies. Be careful to apply the product away from shrimp and crab ponds to prevent drift and contamination of adjacent water bodies. Do not clean spraying equipment in rivers, ponds, lakes, or other water bodies. 3. Do not use in areas where natural enemies such as trichogrammatids are released. 4. This product is irritating to the eyes. Wear protective clothing, gloves, and goggles when applying it. Avoid eating or drinking during application. Wash hands and face promptly after application. 5. It is recommended to rotate the application with insecticides of different working mechanisms. 6. Avoid contact with pregnant and breastfeeding women. 7. Dispose of used containers and waste properly. Do not use them for other purposes or discard them at will.

إسعافات أولية ضد التسمم:

في حال العلاج الجاهزي في حالات التسمم، وإذا تم الاستنشاق ينبغي نقل المريض لمنطقة جيدة التهوية، وفي حالة البلع يجب شرب 1-2 كوب ماء فوراً والحث على التقيؤ وإجراء غسل معوي ونقل المريض للمستشفى مصطحباً هذا المصنف في حالة ملامسته البشرة يجب غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة أقل تقدير وفي حال وصوله العين يجب غسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء لمدة 15 دقيقة والسعي للحصول على مساعدة طبية لا يوبود تزيانك تسمم مدخل المبيد

First aid measures for poisoning:

If poisoning occurs, treat symptomatically. If inhaled, move the patient to a well-ventilated area. If swallowed, drink 1-2 cups of water immediately and induce vomiting. Take the patient to a hospital with this label and perform gastric lavage. If skin contact occurs, rinse immediately with soap and water for at least 15 minutes. If splashed into eyes, rinse immediately with plenty of water for 15 minutes and seek medical attention. There is no specific antidote for this product.

بلد المنشأ: الصين China

Production Date :

تاريخ الإنتاج :

Expiry Date:


تاريخ الانتهاء :

Batch No:

رقم التسجيلة

CAMPOXIFEN ... 100 EC

كامبو كسيفين... 100 أي سي



Content :
Pyriproxyfen
Inert
Total

100 g/L
900 g/L
100%

المكونات :
بيروكسي فين
المادة الخاملة
المجموع

Manufacturer: Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd.

الشركة المصنعة : شركة شينغهاي شينغونغ للمبيدات الحشرية المحدودة

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء : EDE RG NO AUD-AD-140-3115219



الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة Al Ain - Khalefa Street

Showroom: +97137666544 Office: 037666466, Mob. 506636891

Email, aljouriaue@gmail.com Web: www.aljouriamc.com

Net weight: 500 ml

وزن العبوة: 500 مل

كامبو كسيفين :

المبيد عبارة عن نمط هرموني نشط يحول دون تكوين الكيتين والذي هو مادة قاتلة لليرويات ويحول دون نمو الأجنة وقفس البيض أو إنتاج بويضات قابلة للحياة. يستخدم لمقاومة الذبابة البيضاء في الطماطم وذبابة الحمضيات والحشرات القشرية

CAMPOXIFEN : This product is a juvenile hormone-type chitin synthesis inhibitor with ovicidal properties, inhibiting embryonic development and egg hatching or producing inviable eggs. It is used to control tomato whiteflies, citrus tree lice, and scale insects.

نقل وطريقة التطبيق:

المحاصيل	الآفات	نسبة الاستخدام	أساليب الاستخدام	فترة الأمان
ملفوف	الذبابة البيضاء	0.075-0.05 %	رش	3 أيام
الخيار	حشرة القرس، الذبابة البيضاء، المن	0.075-0.0375 %	رش	1 يوم
الفاصوليا	حشرة القرس، المن	0.075-0.0375 %	رش	3 أيام
الطماطم	الذبابة البيضاء، المن	0.075-0.025 %	رش	7 أيام
البانجان	الذبابة البيضاء	0.075-0.05 %	رش	3 أيام
الحمضيات	المن، ذبابة البيضاء	0.075-0.0375 %	رش	3 أيام
فاصوليا الحمضيات	الفترة السوداء، فترة الحمضيات الحمراء	0.075-0.025 %	رش	30 يوم
مشاكل البستنة	الحشرات لاصقة	0.075-0.05 %	رش	NP
التحكم بالزحف	حشرات قشرية	0.075-0.0375 %	رش	NP
التحكم بالزحف	حشرات قشرية	0.075-0.0375 %	رش	NP

Scope and method of application:

Crops	Pests	Use Rate	Safety period
Tomato	White Fly	0.05-0.075 %	3 days
Cucumber	Thrips, Whitefly, Aphids	0.0375-0.05 %	1days
Pepper	Thrips, Aphids	0.0375-0.05 %	3 days
Cabbage	White Fly, Aphids	0.025-0.075 %	7days
Eggplant	White Fly	0.05-0.075 %	3 days
Onion	Aphids, White Fly	0.0375-0.05 %	12 days
Citrus fruits	Black scale, red citrus scale	0.025-0.075 %	30 days
Horticultural seedbeds	Sucking insects	0.05-0.075 %	NP
Plum trees	Scale insects	0.0375-0.05 %	NP
Peach tree	Scale insects	0.0375-0.05 %	NP

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**طرق التخزين والنقل:**

يُحفظ في مستودع جاف وتغليف جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة وأي مصادر نيران أو حرارة أخرى، يمنع تخزينه أو نقله مع الأطعمة والمشروبات أو جنوب الأغذية، كما يجب حفظه مغلقاً وبعيداً عن متناول الأطفال.

Storage and transportation methods:

Store in a dry, cool, clean and ventilated warehouse, avoid sunlight and moisture, and keep away from fire or heat sources. Do not store or transport with food, beverages, grain and feed. Keep out of reach of children and locked.

