

المبيد مقيد الاستخدام لببعية واستخدامه فقط من قبل فنيين مختصين او تحت إشرافهم المباشر.

Insecticide (Restricted Use)

This insecticide is restricted in use and may only be sold and used by qualified technicians or under their direct supervision.

إجراءات احترازية:

هذا يعني سام لنسب ولقد ولدته الحبرية، حينئذ عظماءه على مسطوطته لنسب الجواررة أثناء
الاستخدام، كما استخدمه عرب البساتين الحمراء وقرعة تغذية وحلج و سياتين
التوت. يمنع الاستخدام في مناطق تواجد الحشرات الطبيعية مثل البياض الزرقاوي، أو
الاستخدام بعيدا عن مزارع الكائنات الحية وعدم غسل أجهزة الرش في التربة، ورك
البيوتات، يجب تعقيم وتعقيم أخرى، يجب عدم تعقيم وتعقيم البساتين، ويجب
الحفاظ والتفتيش والتفتيش وتناول الطعام. يجب عدم الاستخدام في الليل والوجه
مناطق أخرى، يجب تجنب التعرض للبيوتات وازداد الصابون وكيميائية من الماء، نوصي
بالاستخدام من حشيرة ذات أليات عمل مختلفة بشكل تباليدي، في السنة الجاهل
الضرعات يجب تلمسه منها، يجب التخلص من البوابات المستخدمة بشكل صحيح وعدم
إعادة استخدامها أو التخلص منها من أكثر

Precautions:

1. This product is toxic to bees and silkworms. Avoid affecting surrounding bee colonies during application. Do not use near flowering plants, silkworm rearing rooms, or mulberry orchards. Do not use in areas where natural enemies such as *Trichogramma* wasps are released.
2. Apply the product away from aquaculture areas. Do not wash application equipment in rivers, ponds, or other bodies of water.
3. Wear protective clothing, masks, and gloves when preparing and applying the product. Smoking and eating are strictly prohibited.
4. After application, thoroughly wash hands, face, and other areas that have come into contact with the product or droplets with soap and plenty of water.
5. It is recommended to alternate with other insecticides with different mechanisms of action.
6. Avoid contact with pregnant and breastfeeding women.
7. Dispose of used containers properly; do not reuse or discard them carelessly.

إجراءات اسعافات أولية في حال التسمم:

تجنب ملامسته مباشرة للبشرة والعيون وفي حال حدوث ذلك يجب الغسل بكثير من الماء لمدة 15 دقيقة على أقل تقدير، وفي حال الاستنشاق يجب نقل المريض لمنطقة ذات تهوية جيدة ويُنصح في حال حدوث تسمم نتيجة إهمال أو سوء استخدام السعي فوراً للحصول على مساعدة طبية مع اضطحاب نشرة المبيد لتلقى العلاج المناسب.

First aid measures for poisoning:

Avoid direct contact of the medication with skin and eyes. If contact occurs, rinse with plenty of water for at least 15 minutes. If inhaled, move the patient to a well-ventilated area. If poisoning occurs due to negligence or misuse, seek immediate medical attention with this label for appropriate treatment.

أساليب التخزين والنقل:

يجب حفظ المبيد في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بعد اغلاقه بإحكام. يحفظ مغلقا 1
بإحكام بعيدا عن متناول الأطفال، 3 لا ينبغي تخزينه او نقله مع الأطعمة والمشروبات والأغذية
الحيوية وما شابه ذلك.

Storage and transportation methods:

1. Store this product in a dark, cool and ventilated place after being sealed. 2. Keep it out of the reach of children and lock it. 3. It cannot be stored and transported together with food, beverage, feed, grain and other items.

Production Date : تاريخ الإنتاج :


Expiry Date : تاريخ الإنتهاء :

Batch No : رقم التشغيل :

کونفیدور پرو 200 اس
CONFIDOR PRO 200 SL

SOLUBLE CONCENTRATE (SL)

مرکز قابل للذوبان (أس ال)



Content	
Imidacloprid :	200 g/L
Inert :	800 g/L
Total :	100%

المكونات
 200 g/L : يميذاكلوبريد
 800 g/L : المادة الخاملة
 100% : مجموع

لشركة المصنعة : شركة رودونج هواشنج الكيماوية المحدودة.
Manufacturer: Rudong Huasheng chemical Co., Ltd.

Origin: China بلد المنشأ: الصين

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء : AUD-AD-140-3326957 EDE RG NO :



الزراعة - المصنوعات الزراعية
EL JOURN AGRICULTURAL MATERIALS

الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة Al Ain - Khalefa Street
Showroom. +97137666544 Office.037666466, Mob. 506636891
Email, aljouriuae@gmail.com Web: www.aljouriamc.com

کونفیدور پرو:

يتمتع المبيد بخصائص جهازية قوية ونشاط مرتفع، يمتلك تسهم عن طريق المعدة وتأثير بالملاصقة ونحو تأثير ضد حشرة المن والأفات ذات أجزاء فم ثاقبة ماصة، يكون أمناً بالنسبة للمحاصيل في حال استخدامه حسب الجرعة الموصى بها.

CONFIDOR PRO: The product has strong systemic properties and high activity, possessing both stomach poison and contact action, and is effective against aphids, pests with piercing-sucking mouthparts. It is safe for crops at the recommended dosage.

نطاق و أسلوب الاستخدام:

[illegible]

Scope and method of application

Vegetables, cereals, oilseed, fruit, berries, lettuce, onion, pepper, cucumber, sprouts, watermelons, citrus, sweet corn, beans, carraway, garlic and radish	Plants	Use Rate	Method of application	PHH
	Aphis, Lophoglyptus, beg. Jassid, Thrips	25-100/100, water	spray and soil	7 days
	Apple, plum, peach	300-600 ml, water	spray and soil	7 days
	Harmothrips myodipnus, Red palm weevil, Leafminers, Citrus, whiteflies, Thrips, Worms borer and Scale insects	4000-10000, water	spray and soil	7 days
Fodder crops (Alfalfa, Fodder corn)	Green worm, American hornworm, Fall armyworm	4000-10000, water	spray and soil	7 days
Ornamental Plants	Greenhouse the diamond-back beetle	25-100/100, water	spray and soil	-

الضمان :

تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد والسلامة في استعماله بشرط حفظه في عبواته الأصلية في ظروف التخزين العادي حتى تاريخ انتهاء صلاحيته بحسب ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة.

Warranty Statement:

The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety for use, provided that it is kept in its original containers under normal storage conditions until its expiry date according to the conditions of the United Arab Emirates.

شروط استخدام:

استخدام المبيد في المرحلة الاولى من انتشار حشرة المن، بصفة عامة لمرحلة الشلات 1 والإزهار، رش جانبي الأوراق بشكل متساوي يفضل في أوقات الصباح او المساء. 2 يمنع استخدام المبيد أيام الحراخ او توقع سقوط أمطار خلال ساعة، 3 يمنع استخدام المبيد لأكثر من مرتين في موسم الحصول

Use technical requirements:

1. Apply pesticides at the initial stage of aphid infestation, generally during the seedling and rosette stages. Spray evenly on both sides of the leaves, preferably in the morning or evening. 2. Do not apply pesticides on windy days or if rain is expected within one hour. 3. Do not apply pesticides more than twice per crop season.

يُحْفَظْ بَعِيدًا عَنْ مَتَنَاوِلِ الْأَطْفَالِ **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Net weight: 1000 ml. سعة العبوة: 1000 مل.