

أساليب تخزين ونقل: Storage and transportation methods:

يجب تخزين هذا المبيد في منطقة جيدة التهوية وجافة، بعيدة عن المطر، بشكل قائم غير مطلوب، بعيداً عن مصادر النار والحرائق، 2. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص من غير ذوي العلاقة والحيوانات الأليفة، على المبيد مغلفاً بإحكام. 3. يمنع تخزين هذا المبيد أو نقله مع الأطعمة والمشروبات والحبوب والبيذور وعسل الحيوانات أو ما شابه ذلك. 4. يجب أخذ النقل لحماية المبيد من أشعة الشمس المباشرة والأسفلت على الأشخاص المشاركين في عمليات التحميل والتفريغ أثناء معدات وقاية متساوية المبيد بعناية لضمان عدم التسرب من العربات وتلوثها أو سائحتها أو تلوثها.

1. This product should be stored in a cool, dry, well-ventilated, and rain-protected area; do not invert. Keep away from sources of fire and heat. 2. This product must be kept out of the reach of children, unauthorized personnel, and animals, and should be stored under lock and key. 3. Do not store or transport this product together with food, beverages, grain, seeds, animal feed, or similar items. 4. During transport, protect the product from direct sunlight and rain. Personnel involved in loading and unloading must wear protective gear and handle the product with care to ensure that the containers do not leak, collapse, fall, or sustain damage.

إجراءات احترازية: PRECAUTIONS:

1. يرجى استخدام هذا المبيد من خلال التقيد التام بإرشادات سلامة المبيدات الحشرية. يجب على مستخدمي المبيد أثناء الرش ارتداء ملابس طويلة الأكمام وسراويل طويلة وأقذية واقية وغطاءات واقية وقفازات واقية وغيرها من معدات الوقاية. كما يجب منع أثناء رش المبيد تناول الطعام أو الشراب أو التدخين. 2. لا يجوز التخلص من عبوات المبيد المرافقة بشكل عشوائي أو مستلق بل يجب إعادتها بسرعة لحفظ إعادة تدوير عبوات المبيدات الحشرية المخصصة لذلك. كما يجب غسل معدات الرش في الأنهار وبرك المياه أو أية مسطحات مائية. كذلك لا يجوز سكب أية بقايا من المبيد بعد الرش بشكل عشوائي وغير منظم. يمنع استخدام في أي دول مناطق الكثافات العالية أو الأتربة أو برك المياه أو أية مسطحات مائية أخرى. أيضاً يمنع استخدام حول مساحات الطيور أو قرب أماكن تغذية البوم والطيور وبساتين التوت أو في مناطق حيث توجد الأعادي المهيمنين أمثال الخنافس. 5. ننصح بتدوير استخدام هذا المبيد مع مبيدات عت وثرات ذات آليات مقاومة مختلفة وذلك لتأخير تطور مقاومة أو رفض آفات العت المستخدمة للمبيد 4. يجب بعد الاستخدام الاستحمام وغسل ملابس العمل فوراً، وتنظيف كافة أجهزة الرش في الحال، 6. على النساء الحوامل المرضعات تجنب استخدام هذا المبيد.

1. Please use this product in strict accordance with pesticide safety guidelines. During application, operators must wear long-sleeved clothing, long trousers, a hat, a face mask, gloves, safety goggles, and other protective gear. Do not eat, drink, or smoke while handling the product. 2. Empty pesticide containers must not be discarded indiscriminately or disposed of independently; they should be promptly returned to a designated pesticide container recycling station. It is strictly prohibited to wash application equipment in rivers, ponds, or other bodies of water; furthermore, any leftover spray solution remaining after application must not be poured out indiscriminately. Application is prohibited in and around aquaculture zones, rivers, ponds, and other bodies of water. Application is also prohibited in and around bird sanctuaries, near silkworm rearing rooms and mulberry orchards, and in areas where natural enemies (such as ladybugs) are being released. 3. It is recommended to rotate the use of this product with acaricides possessing different mechanisms of action to delay the development of resistance in target mites. 4. Immediately after application, take a shower, and change into and wash your work clothes. Clean all spraying equipment promptly. 5. Pregnant and breastfeeding women should avoid contact with this product.

إجراءات إسعافات أولية عند التسمم: FIRST AID MEASURES FOR POISONING:

السمية الفموية والجلدية منخفضة، إلا أن المبيد يسبب تهيج عيون وبشرة ومجوى التنفس. إجراءات إسعافات أولية: يجب عند ملامسته البشرة غسلها فوراً بالماء والصابون، وفي حال ملامسة العيون، يجب غسل العين بعاء، ثم نقلي لمدة 15 دقيقة كحد أدنى، وفي حال الاستنشاق نقل المصاب لمكان جيد التهوية وفي حال الالع المصاب، نقل المصاب فوراً إلى المستشفى معطجاً بشدة أو معلقاً بالماء.

لا يوجد حالياً تراكب أمطار لمبيد محدد لهذا المبيد. Symptoms of Poisoning: Oral and dermal toxicity are low; however, the substance causes irritation to the eyes, skin, and respiratory tract. First Aid Measures: In case of skin contact, immediately wash thoroughly with soap and water. If splashed into the eyes, immediately flush with running water for at least 15 minutes. In case of inhalation, immediately move the victim to a well-ventilated area with fresh air. In case of accidental ingestion, immediately seek medical attention, bringing the product label with you. There is currently no specific antidote for this product.

تاريخ الإنتاج :

Expiry Date:

Batch No:

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الإنتهاء :

رقم التشفية



الجورى للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

الموكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

المن - شارع خليفة Al Ain - Khalifa Street
Showroom. +9713766544 Office.037665466, Mob. 506636891
Email, aljouriaae@gmail.com Web: www.aljouriamc.com



فلورامايت برو Floramite Pro

SOLUBLE CONCENTRATE (SC)

مركز مُعلَق

المكونات :
Bifenazate 30 + Etoxazole 10 (W/W) 40 %
المادة الخاملة (و / و) 60 %
Inert (W/W) : 100 %
المجموع :

مبيد حشري (مبيد الاستخدام) المبيد مائل الاستخدام لوبعة واستخدامه فالحظ من قبل فنيين مختصين أو تحت إشرافهم المباشر. Insecticide Restricted Use: This insecticide is restricted in use and may only be sold and used by qualified technicians or under their direct supervision.

فلورامايت برو : يتكون هذا المبيد من صيغة معدة مسبقاً من بيفينازيت وإيتوكسازول ويتمتع بفعالية في القضاء على البعوض والعت أثناء جميع مراحل تطورها بما في ذلك البيض واليرقات والحواريات والآفات البالغة ولتة مناسب لمقاومة العنكب الحمر، التي تصيب الأشجار المثمرة وحاصل الخسروات.

FLORAMITE PRO: This product is a premixed formulation of bifenazate and etoxazole, it exhibits potent ovicidal and acaricidal activity against all developmental stages of pest mites—including eggs, larvae, nymphs, and adults—and is suitable for the control of red spider mites on fruit trees and vegetable crops.

نطاق واسلوب الاستخدام:

المحاصيل	اسم الآفات الضارة	الجرعة والفتره	الاساليب	فترة الاستخدام
الخيار	العنكبوت الأحمر ذو نقطتين (Tetranychus Urticae) الأكاروس عريض (Polyphagotarsonemus latus)	35 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	1 أيام
الطماطم والباذنجان	العنكبوت الأحمر ذو نقطتين (Tetranychus Urticae) الأكاروس عريض (Polyphagotarsonemus latus)	35 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	3 أيام
الفلل (بيوت محمية)	العنكبوت الأحمر ذو نقطتين (Tetranychus Urticae) الأكاروس عريض (Polyphagotarsonemus latus)	35 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	3 أيام
البطيخ والشمام	العنكبوت الأحمر (Tetranychus cinnabarinus) الأكاروس عريض (Polyphagotarsonemus latus)	25 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	3 أيام
الحمضيات واللوز	العنكبوت الأحمر (Tetranychus cinnabarinus)	35 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	21 أيام
أشجار النخيل	عنكبوت الغبار (Dermatophagoides pteronyssinus) العنكبوت الأحمر (Tetranychus cinnabarinus)	35 مل/100 لتر ماء بعضة، يرقة، حورية بالغة	رش	14 أيام

SCOPE AND METHOD OF APPLICATION:

Crops	Harmful organism name	Dosage and period	Methods of application	PHI
Cucumber	Two-point red spider (Tetranychus Urticae) Broad Mite (Polyphagotarsonemus latus)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	1 days
Tomato and Eggplant	Two-point red spider (Tetranychus Urticae) Broad Mite (Polyphagotarsonemus latus)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	3 days
Pepper (Greenhouse)	Two-point red spider (Tetranychus Urticae) Broad Mite (Polyphagotarsonemus latus)	25 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	3 days
Watermelon and Melon	Red Spider (Tetranychus cinnabarinus) Broad Mite (Polyphagotarsonemus latus)	25 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	3 days
Citrus and Figs	Red Spider (Tetranychus cinnabarinus)	25 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	7 days
Palm tree	Dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) Red Spider (Tetranychus cinnabarinus)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal, Adult.	Spraying	14 days

بيان ضمان : تتضمن الشركة العتادة استقار خصائص المبيد الكيميائية والفيزيائية كذلك سلامته للاستخدام، شريطة حفظه في عبواته الأصلية وتحت ظروف تخزين مائية حتى تاريخ انتهاء صلاحيته طبقاً لشرط الامارات العربية المتحدة.

Warranty Statement: The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety for use, provided that it is kept in its original containers under normal storage conditions until its expiry date according to the conditions of the United Arab Emirates.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Manufacturer: Jiangsu Changqing Biotechnology Co., Ltd.

الشركة المصنعة : شركة جيانجسو تشانجويينج لتقنية الكيمياء الحيوية المحدودة .

Origin : China بلد المنشأ: الصين

رقم التسجيل في مؤسسة الامارات للدواء : 140-3377494 EDE RG NO AUD-AD-

وزن العبوة 250 ml/مل

Net weight