

Caution :

* Avoid exclusive repeated use of insecticides from the same insecticide group code. Alternate or tank mix with products from different insecticide group codes. * Read label carefully before applying. Wear rubber gloves when handling, preparing and applying the spray mixture. Wash with soap and water after use or in the event of accidental skin contact. Do not enter treated area until spray deposit has dried unless wearing protective. * Prevent drift onto other crops, grazing, rivers, dams, or any other area not under treatment. * Toxic to bees and silkworm. Never apply on flowering period. Avoid influence swarms during application. Never apply on silkworm nursery and mulberry field. Never apply near river and aquaculture region. Clean the applicator thoroughly after use and dispose of the wash water where it will not contaminate food, grazing, rivers or dams. *Containers and packages must be completely emptied before being disposed of. Bury in an approved, designated landfill.

*Avoid apply by pregnant woman and people who allergic to it.

First Aid : If swallowed: Induce vomiting, give plenty of water and see a doctor.

Skin contact: Wash skin thoroughly and wash contaminated clothing before re-use.

Eye contact: Rinse eye under running water and see a doctor.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال KEEP LOCKED UP OUT OF REACH OF CHILDREN

Production Date :

Expiry Date:

Batch No:

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الإنتهاء :

رقم التشغيلية :

تحذير:

*1 تجنب تكرار استخدام المبيدات الحشرية من نفس كود المبيد الحشري. التبادلية أو الخلط مع مبيدات من مجموعة مبيدات حشرية ذات كود مختلف. * قراءة النشرة بعناية قبل الاستخدام. ارتداء قفازات مطاطية عند المناولة كذلك عند تحضير واستخدام خليط الرش. الغسل بالماء والصابون بعد الاستخدام أو عند ملامسته البشرة بشكل عرضي. يمنع دخول المنطقة المعالجة حتى جفاف ترسبات الرش في حال عدم ارتداء قفازات. * تجنب جرفه لمحاصيل أخرى، أماكن الرعي، الأنهار، السدود أو أية منطقة ليست تحت المعالجة. * سام بالنسبة للنحل ودودة الحرير. يمنع الرش أثناء فترة الإزهار. تجنب أسراب النفوذ أثناء الاستخدام. يحظر الرش في مشاتل دودة الحرير وحقول التوت. تجنب الاستخدام قرب الأنهار وأماكن المزارع المائية. تنظيف جهاز الاستخدام بعناية بعد استخدامه والتخلص من ماء التنظيف بحيث لا تسبب تلوث الأطعمة وأماكن الرعي أو الأنهار أو السدود. * يجب افراغ الحاويات والعبوات بشكل تام قبل التخلص منها ودفنها في مدافن ارضية معتمدة ومخصصة لذلك. *تجنب الاستخدام بواسطة نساء حوامل وأشخاص لديهم حساسية تجاهه.

اسعافات أولية في حالة البلع: الحث على التقيؤ، إعطاء المصاب كمية كبيرة من الماء ومراجعة طبيب.

عند ملامسة البشرة: غسل البشرة بعناية كذلك غسل الملابس الملوثة قبل إعادة الاستخدام.

عند ملامسة العين: غسل العين بماء جاري ومراجعة طبيب.

أكشن

دبليو جي

ACTION WG

Content :
Indoxacarb 30%
Inert 70%
Total 100%

المكونات :
اندوكسيكارب 30%
المادة الخاملة 70%
المجموع 100%

الشركة المصنعة: شركة شاندونج جينجيو لتكنولوجيا الزراعة الكيماوية المحدودة.
Manufacturer: Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.

رقم التسجيل في مؤسسة الامارات للدواء : EDE RG NO AUD-AD-140-3141353



الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOUR AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة
Showroom. +97137666544 Office.037666466, Mob. 506636891
Email, aljouriaue@gmail.com Web: www.aljouriamc.com

اندوكسيكارب: يعمل بالملامسة (الامتصاص من خلال بشرة الحشرة) او المعدة نتيجة البلع. يعمل بصفة رئيسية من خلال اغلاق قنوات الصوديوم في خلايا أعصاب الحشرة مسببا تلف وشلل الحشرات المستهدفة. منع التغذية خلال 4 ساعات بعد الاستخدام. قد يحدث موت الحشرة خلال 2 يوم.

Indoxacarb: It acts by means of contact action (absorption through insect's cuticle) or stomach action due to ingestion. It is mainly through blocking the sodium channels in the nerve cells of the pests, damaging and paralyzing the target pests. Feeding is inhibited within 4 hours after application. Death of the pest may occur within 2 days.

التطبيقات واسلوب الاستخدام:

المحاصيل	الآفات	السمية جرام / 100 لتر ماء	فترة المعالجة
البناتجيات (مشمش، بادشاه، واطح)	دودة القز	25-30	3 أيام
القمح (القمح، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	25	3 أيام
البناتجيات (البناتج، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	25-30	3 أيام
البناتجيات (البناتج، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	30	3 أيام
البناتجيات (البناتج، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	30-40	1.4 يوم
البناتجيات (البناتج، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	30-40	1.4 يوم
البناتجيات (البناتج، القمح، القمح)	دودة القز، دودة القز، دودة القز	30-35	—

Scope and method of application:

Crops	Pests	Application Rate Gr /100L water	PHI
Solanaceae (Tomato, Eggplant and pepper...)	Fruitworm	2.5-3.0	3 Days
Cucurbitaceae (Cucumber, Zucchini, Watermelon, Melon)	Fruitworm, Green Worm	2.5	3 Days
Brassicaceae (Cabbage, Cauliflower, Broccoli, Radishes)	Greenworm, Leavesworm	3.0-3.5	7 Days
Leafy vegetables (Lettuce, Spinach, Chard, Arugula, Parsley, coriander, Leafy onion)	Greenworm, Leavesworm, Lepidoptera Pests	3.0	7 Days
Fruit trees (Figs, Mangoes, Citrus trees)	Fruitworm, Drosophila larvae	3.5-4.0	1-4 Days
Fodder crops (Alpha Alpha, Fodder corn)	Green worm, American almondfworm, Fall armyworm	3.5-4.0	1-4 Days
Ornamental Plants	Greenworm, The diamond-backed butterfly	3.0-3.5	—

وزن العبوة : 250 غرام Net weight: 250gram