

الاحتياطات:

1- قراءة نشرة المبيد بعناية واستخدامها حسب الإرشادات، 2- يعتبر هذا المبيد سام للنحل والحياة المائية (كالأسماك) ودودة الحبر، لذا ينبغي تجنب التأثير على مناطق تربية النحل ودودة الحبر ومزارع التوت، يجب الاستخدام بعيداً عن مناطق المزارع المائية كما يمنع غسل معدات الرش في الأنهار وبرك المياه وتجمعات المياه الأخرى، 3- يجب ارتداء معدات وقاية أثناء الرش كذلك يحظر تناول الطعام أو التدخين أو الشرب،

4- يجب بعد العمل القيام فوراً بتنظيف معدات الاستخدام واليدين والوجه وتغيير الملابس والتخلص بشكل صحيح من العبوات الفارغة، 5- ينبغي بالتدوير مع مبيدات حشرية ذات نظم تأثير مختلفة بهدف تأخير تطوير مقاومة المبيد، 6- يمنع النساء الحوامل والمرضعات من ملامسة هذا المبيد 7- التخلص من العبوات الفارغة حسب المتبع وعدم إعادة استخدامها لأية أغراض أخرى أو التخلص منها بصورة عشوائية

Precautions:

1. Read the product label carefully and use strictly according to instructions. 2. This product is toxic to bees, aquatic organisms (such as fish), and silkworms. Avoid affecting nearby bee colonies during application; do not use on flowering plants during the blooming period or near silkworm rearing rooms and mulberry orchards. Apply away from aquaculture areas; do not wash application equipment in rivers, ponds, or other bodies of water. 3. Wear protective gear during application; do not eat, smoke, or drink. 4. After work, promptly clean application equipment, wash hands and face, change clothes, and properly dispose of waste packaging. 5. Rotation with insecticides having different modes of action is recommended to delay the development of resistance. 6. Pregnant and lactating women must not come into contact with this product. 7. Properly dispose of used containers; do not reuse for other purposes or discard indiscriminately.

إجراءات إسعافات أولية عند التسمم:

تشمل الأعراض المبكرة للتسمم اتساع حدقة العين، وعدم اتزان الحركة، ورعشة العضلات وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى القيء،

الاستنشاق: انقل المريض فوراً إلى منطقة جيدة التهوية فوراً، ملامسة الجلد والعينين: الغسل بكمية وفيرة من الماء لمدة 15 دقيقة كحد أدنى. الابتلاع: الحث على التقيؤ فوراً وإعطاء المصاب شرباً ما يعرف بعرق الذهب أو اليبيبكال، يمنع الحث على التقيؤ أو إعطاء أي شيء لمصاب فاقد الوعي. يجب في الحالات الشديدة نقل المريض للمستشفى لتلقي العلاج مع اصطحاب نشرة المبيد.

First aid measures for poisoning:

Early symptoms of poisoning include dilated pupils, uncoordinated behavior, and muscle tremors; severe cases may lead to vomiting. Inhalation: Immediately move the patient to a well-ventilated area. Skin/Eye Contact: Rinse with plenty of water for at least 15 minutes. Ingestion: Induce vomiting immediately and administer ipecac syrup or ephedrine; do not induce vomiting or administer anything to an unconscious person. In severe cases, take the patient to a hospital for treatment, bringing this label along.

الضمان: تضمن الشركة المصنعة استقرار المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المنتج وسلامة استخدامه، شرطاً أن يتم الاحتفاظ به في عبواته الأصلية في ظروف التخزين العادية حتى تاريخ انتهاء صلاحيته وفقاً لشروط دولة الإمارات العربية المتحدة.

Warranty : The manufacturing company guarantees the stability of the chemical and physical specifications of this product and its safety of its use, provided that it is kept in its original containers in normal storage conditions until the date of its expiration according to the conditions of the United Arab Emirates.

Origin: China
Production Date:
Expiry Date:
Batch No:

بلد المنشأ: الصين
تاريخ الإنتاج:
تاريخ الانتهاء:
رقم التشغيل:

رومكتين برو

مركز قابل للاستحلاب (أي سي)

ROMECTIN^{PRO}

Emulsifiable concentrate (EC)

Content	المكونات
Abamectin (w/w) 1.8 %	أبامكتين (و/و)
Inert(w/w) 98.2 %	المادة الخاملة (و/و)
Total 100%	المجموع

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

الشركة المصنعة شركة شنتشي هينغتيان للزراعة البيولوجية المحدودة.
Manufacturer: ShaanXi Hengtian Biological Agriculture Co., Ltd.
رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء : EDF RG NO :

Exclusive Agent

الوكيل الحصري



الجورى للمواد الزراعية
AL-JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة، AlAin - Khalefa Street
Showroom: +97137664544 - Office: 037664666, Mob. 506436891
Email: aljouriaae@gmail.com - Web: www.aljouriamc.com

Net weight: 1000 ML

سعة العبوة: 1000 مل

رومكتين برو: يعمل هذا المبيد عن طريق الملامسة والسمية المعدية ويمنع بعض النشاط التبخيري، وينفذ بقوة داخل أوراق المحاصيل لقتل الآفات الموجودة تحت الغطاء الخارجي، كما يتمتع بتأثير طويل الأمد.

ROMECTIN PRO: This product acts via contact and ingestion, possesses some fumigant activity, and penetrates strongly into crop leaves to kill pests beneath the epidermis; it also offers a long-lasting residual effect.

نطاق وطريقة الاستخدام:

المحاصيل	الآفات	نسبة الاستخدام 100 / لتر ماء	أسلوب الاستخدام	فترة السلامة
طماطم	العنكبوت ذو البقع، الأكاروس العريض	35-45 مل	رش	3 أيام
خيار	العنكبوت ذو البقع، الأكاروس العريض	35-45 مل		يوم 1
فلفل	العنكبوت ذو البقع، الحلم اليربوعيدي	40-50 مل		3 أيام
ملفوف	العنكبوت ذو البقع	35-45 مل		7 أيام
بادنجان	العنكبوت ذو البقع	40-50 مل		3 أيام
بصل	العنكبوت ذو البقع، الأكاروس العريض	35-45 مل		7 أيام
فاكهة الحمضيات	العنكبوت ذو البقع، الأكاروس العريض	50 مل		يوم 14
نباتات زينة	العنكبوت ذو البقع، الحلم اليربوعيدي	35-45 مل		NP
أشجار اللب	عنكبوت الغبار، العنكبوت الأحمر الأوروبي	35-40 مل		يوم 14
أشجار التين	العنكبوت ذو البقع، الأكاروس العريض	40-50 مل		3 أيام
أصناف حلق وصلع دولف	نيماتودا تعقد الجذور (Meloidogyne spp)	40-50 مل		3 أيام
ري التربة				

Scope and method of application:

Crops	Pests	Use Rate/100 Liters of water	Methods of application	PHI
Tomato	Two-spotted spider mite, Broad mite.	35-45 ml	Spraying	3 days
Cucumber	Two-spotted spider mite, Broad mite.	35-45 ml	Spraying	1days
Pepper	Two-spotted spider mite, Eriophyid mites	40-50 ml	Spraying	3 days
Cabbage	Two-spotted spider mite	35-45 ml	Spraying	7days
Eggplant	Two-spotted spider mite	40-50 ml	Spraying	3 days
Onion	Two-spotted spider mite, Broad mite.	35-45 ml	Spraying	7 days
Citrus fruits	Two-spotted spider mite, Broad mite.	50 ml	Spraying	14 days
Ornamentals	Two-spotted spider mite, Eriophyid mites	35-45 ml	Spraying	NP
Plam trees	Dust mite European red mite	40-50 ml	Spraying	14 days
Fig trees	Two-spotted spider mite, Broad mite.	40-50 ml	Spraying	3 days
Garden and Golf Course Grasses	Root-knot nematodes (Meloidogyne spp)	40-50 ml	Soil irrigation	3 days

طرق التخزين والنقل:

يحفظ في مكان جاف وبارد وجيد التهوية ومحمي من المطر، وبعيداً عن مصادر النار أو الحرارة. يحفظ مغلقاً وبصورة بعيدة عن متناول الأطفال. يمنع تخزينه أو نقله إلى جانب الأطعمة أو المشروبات أو أعلاف الحيوانات أو الحبوب.

Storage and transportation methods:

Store in a dry, cool, well-ventilated area protected from rain, and keep away from sources of fire or heat.

Keep locked up and out of the reach of children. Do not store or transport together with food, beverages, animal feed, or grain.