

**ريفيكور بلس :** هذا المبيد خليط من المبيد الفطري العلاجي فلوبيكوليد والمبيد الفطري الجهازى بروباموكارب هيدروكلوريد ذو التأثير الوقائي والعلاجي ويستخدم لمقاومة أمراض اللثة المتأخرة في الطماطم والبطاطا والفلفل وساق التبغ السوداء

**REVICUR PLUS :** This product is a compound of the therapeutic fungicide fluopicolide and the systemic fungicide propamocarb hydrochloride, which has protective and therapeutic effects. It issued to control tomato late blight, potato late blight, pepper blight, and tobacco black shank.

**نطاق وطريقة التطبيق:**

| المحاصيل                                     | الآفات                              | الجرعة                                                                                                                                                         | فترة التحريم |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الخيار والبطيخ والفليفلة والباذنجان والطماطم | غفن الجذور (البنيثيوم، الفيتوفثورا) | يوصى بالرش الأول بعد وضع البذور، وتكرار الرش عند الضرورة بعد 10-14 يوم 3 مل من المنتج/ متر مربع. تكرر الرش عند الضرورة خلال 7-10 أيام بعد الزراعة في نظام الري | -            |
| الخس والكرفس                                 | البياض الزغبى                       | رش الأوراق بوضع 2.5 لتر /هكتار                                                                                                                                 | 3 أيام       |
| نباتات الزينة                                | غفن الجذور (البنيثيوم)              | يوصى بالرش الأول بعد البذور، تكرر الرش عند الضرورة بعد 10-14 يوم. بوضع 3 مل من المنتج/متر مربع                                                                 | 3 أيام       |
|                                              | البياض الزغبى                       | رش الأوراق بوضع 2.5 لتر /هكتار                                                                                                                                 | 3 أيام       |
|                                              | البياض الزغبى                       | رش الأوراق بوضع 2.5 لتر /هكتار                                                                                                                                 | 3 أيام       |

**Scope and method of application:**

| Crops                                          | Pests                                  | Dosage                                                                                                                                                                                                                | PHI    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cucumber, Watermelon, Pepper, Eggplant, Tomato | Root rot (Pythium spp. , Phytophthora) | The first application is recommended after sowing, if necessary repeat application after 10-14 days - 3 ml product/m² After transplanting by irrigation system 3 L/Ha if necessary repeat application after 7-10 days | --     |
|                                                | Downy mildew                           | Foliar application 2.5 L/Ha                                                                                                                                                                                           | 3 days |
| Lettuce, Cabbage                               | Root rot Pythium spp.                  | The first application is recommended after sowing, if necessary repeat application after 10-14 days - 3 ml product/m²                                                                                                 | 3 days |
|                                                | Downy mildew                           | Foliar application 2.5 L/Ha                                                                                                                                                                                           | 3 days |
| Ornamentals                                    | Downy mildew                           | Foliar application 2.5 L/Ha                                                                                                                                                                                           | --     |

**يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**Manufacturer: YUN Cropcare Co., Ltd**

**الشركة المصنعة : شركة يون كروب كير المحدودة**

**Origin : China** بلد المنشأ: الصين

**Production Date :**

**Expiry Date:**

**Batch No:**

**تاريخ الإنتاج :**

**تاريخ الانتهاء :**

**رقم التشفيلة**

**المبيد مقيد الاستخدام:**

ليبيع ولاستخدامة فقط من قبل فنيين مرخصين أو تحت إشرافهم الفني المباشر

**RESTRICTED USE PESTICIDE:**

for retail sale to and use only by certified applicators or persons under their direct supervision



اس سي  
ريفيكور بلس  
REVICUR PLUS

**Content :**  
**Propamocarb hydrochloride**  
**Fluopicolide**  
**Inert**  
**Total**

625 g/L  
62.5 g/L  
312.5 g/L  
100%

**المكونات**  
**بروباموكارب هيدروكلوريد**  
**فلوبيكوليد**  
**المادة الخاملة**  
**المجموع**

**EDE RG NO. AUD-AD-140-3127171**

**قم التسجيل في مؤسسة للدواء**



**الجورى للمواد الزراعية**  
**AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS**

**الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية**  
**AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS**

العين - شارع خليفة Al Ain - Khalefa Street

Showroom. +97137666544 Office.037666466, Mob. 506636891

Email, aljouriaue@gmail.com Web: www.aljouriamc.com

**Net weight: 1000 ml**

**وزن العبوة: 1000 مل**

**إرشادات غنية للاستخدام:** 1- رش الأوراق في مراحل المرض المبكرة، 2- تحضير المحلول بصب كمية صغيرة من الماء في جهاز الرش ومن ثم إضافة الكمية الموصى بها من هذا المبيد والتحرك بعناية لخلط المحلول واضف قدر كاف من الماء، 4- يُنصح باستخدام المبيد كل 7-10 أيام بعد أقصى لا يتجاوز ثلاث استخدامات في للفصل الواحد، 5- فترة الأمان: 3 أيام.

**Use technical requirements:** 1. Spray foliage at the early stages of the disease. 2. To prepare the solution, pour a small amount of water into the sprayer, then add the recommended amount of this product. Stir thoroughly to dissolve the solution, then add sufficient water. 4. It is recommended to apply the product every 7-10 days, with a maximum of three applications per season. 5. Safety interval: 3 days.

**إجراءات احترازية:** 1- يجب عند استخدام هذا المبيد اتخاذ إجراءات سلامة احترازية مناسبة بما في ذلك ارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل طويلة وأحذية خاصة وقبعات ونظارات واقعة وقفازات وغيرها من معدات الوقاية لتجنب الملامسة بالبشرة والعيون أو الاستنشاق عن طريق الفم والأنف. يمنع أثناء الاستخدام تناول الطعام أو الشراب أو التدخين. غسل البشرة المعرضة للملامسة كاليدين والوجه وتغيير الملابس فوراً بعد الاستخدام. 2- ننصح بتدوير استخدام المبيد الفطري باستخدام آليات تأثير مختلفة وذلك لتأخير تطوير مقاومة الآفات للمبيد. 3- يمنع التخلص من عبوات المبيد الفارغة بشكل عشوائي، بل ينبغي إعادتها لمستخدم المبيد أو مركز إعادة تدوير نفايات عبوات المبيد الفارغة. يمنع غسل معدات الرش في الأنهار أو برك المياه وغيرها من التجمعات المائية. كما يمنع التخلص من بقايا المبيد بعد الاستخدام بشكل عشوائي. 4- الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات والمصابين بحساسية تجنب ملامسة هذا المبيد.

**Precautions:** 1. When using this product, appropriate safety precautions should be taken, including wearing long sleeves, long pants, boots, a hat, goggles, a mask, gloves and other protective equipment to avoid contact with skin and eyes and inhalation through the mouth and nose. Do not eat, drink, or smoke during use. Wash exposed skin such as hands and face and change clothes immediately after use. 2. It is recommended to rotate the use of fungicides with different mechanisms of action to delay the development of resistance. 3. Pesticide packaging waste must not be discarded or disposed of at will. It should be promptly returned to the pesticide operator or a pesticide packaging waste recycling station. It is prohibited to wash spraying equipment in rivers, ponds and other water bodies, and the remaining liquid after application must not be dumped at will. 4. Children, pregnant women, breastfeeding women and people with allergies should avoid contact with this product.

**إجراءات إسعافات أولية عند التسمم:** يجب عند الشعور بعدم الارتياح أثناء الاستخدام التوقف عن العمل فوراً واتخاذ إجراءات طارئة. في حال ملامسة العيون، يجب غسلها بكثير من الماء لمدة 15 دقيقة على أقل تقدير. في حال ملامسة البشرة يجب خلع الملابس الملوثة فوراً وغسلها بالماء لمدة 15 دقيقة على أقل تقدير. في حال الاستنشاق يجب الابتعاد عن منطقة الاستخدام والذهاب لمنطقة جيدة التهوية. في حال استمرار الشعور بعدم الارتياح السعي للحصول على مساعدة طبية مع إظهار نشرة المبيد. في حال البلع، يجب غسل الفم وطلب مساعدة طبية فوراً مع إظهار نشرة المبيد. لا يوجد ترياق محدد ضد التسمم بهذا المبيد، بل يجب إجراء علاج اعراضى

**First aid measures for poisoning:** If you experience any discomfort during or after use, stop working immediately and take emergency measures. If contact with eyes occurs, rinse with plenty of water for at least 15 minutes. If skin contact occurs, remove contaminated clothing and immediately rinse with water for at least 15 minutes. If inhaled, immediately leave the application area and move to a well-ventilated area. If discomfort persists, seek medical attention immediately, showing the label. If ingested, rinse mouth thoroughly with water and seek medical attention immediately, showing the label. There is no specific antidote for this product; treatment should be symptomatic.

**أساليب التخزين والنقل:** 1- يجب تخزين هذا المبيد في مكان بارد وجاف وجيد التهوية بعيداً عن الأمطار وعدم تخزينه رأساً على عقب وبعيداً عن مصادر التبريد والحرارة، 2- يجب تخزينه منفصلاً بأكمام وبعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير المتخصصين والحيوانات، 3- يمنع تخزينه أو نقله مع الأطعمة أو المشروبات أو الحبوب أو البذور أو الأعلاف، 4- حماية المبيد أثناء النقل من أشعة الشمس والأمطار. على من يقوم بتحميل أو تفريغ المبيد استخدام معدات وقائية ومناولة بعناية للتأكد من عدم تسرب أو انهيار أو سقوط أو تلف العبوات.

**Storage and transportation methods:** 1. This product should be stored in a cool, dry, well-ventilated area, protected from rain. Do not store upside down. Keep away from sources of fire and heat. 2. This product should be kept locked and out of reach of children, unauthorized personnel, and animals. 3. Do not store or transport with food, beverages, grain, seeds, or feed. 4. Protect from sunlight and rain during transportation. Loaders and unloaders should wear protective gear and handle with care to ensure the container does not leak, collapse, fall, or become damaged.

