

إشتراطات فنية للاستخدام:
الرش بالماء بشكل متساوي عند اعلى مستويات تفشي حوريات العناكب الحمراء. 2- يمنع الرش في الأيام العاصفة او عند 1 توقع سقوط امطار خلال ساعة. 3- يجب الانتظار لمدة 21 يوم من استخدام هذا المبيد قبل جني ثمار الحمضيات. يمنع الاستخدام لأكثر من مرة واحدة في الفصل الواحد.

Use technical requirements:
1. Spray evenly with water when citrus trees are at their peak infestation of young red spider nymphs. 2. Do not apply on windy days or when rain is expected within the hour. 3. Wait at least 30 days after using this product before harvesting citrus fruits. Use no more than once per season.

إجراءات احترازية:
يمنع خلط هذا المبيد مع مزيج يورديوكس، 2- هذا مبيد سام للكائنات المائية كالسمك وبرغوث الماء الكبير، يُحفظ المبيد 1 بعيدا عند الاستخدام عن المناطق المائية والأنهار وبرك المياه وغيرها من المكونات المائية. يُمنع غسل معدات الاستخدام في الأنهار او برك المياه وغيرها من المكونات المائية. يمنع استخدام المبيد في مناطق تواجد الأعداء الطبيعيين مثل ما يعرف يجب استخدام هذا المبيد اتخاذ إجراءات احترازية ملائمة. 3- يجب ارتداء حذاء طويل 3- **Trichogrammatids** بتريكوغراماتيدات وملابس وسراويل بأكماء طويلة وقفازات واقعة وقائية...الخ وذلك لتجنب ملامسة المبيد للبشرة واستنشاقه عن طريق الفم أو الأنف. يمنع أثناء استخدام المبيد التدخين أو الشرب أو تناول الطعام. يجب بعد الاستخدام غسل اليدين والوجه وأية مناطق أخرى تعرضت للمبيد بكمية كبيرة من الماء والصابون وتغيير الملابس الملوثة بالمبيد، 4- يجب التخلص من العبوات المستخدمة بشكل صحيح وإرادي وعدم استخدامها لأي أغراض أخرى، نوصي بتدوير استخدام هذا المبيد من خلال اتباع آليات عمل مثقطة بهدف تأخير تطوير مقاومته، 6- يحظر على الأطفال، النساء الحوامل والنساء المرضعات من ملامسة المبيد. كما انه محظور على أشخاص لديهم حساسية، وينبغي في حالة تعرض أي شخص لرود فعل عكسية أثناء استخدام مراجعة الطبيب في حينه

Precautions:
1) This product cannot be mixed with Bordeaux mixture. 2) This product is toxic to aquatic organisms such as fish and large daphnia. Keep away from aquaculture areas, rivers and ponds and other water bodies when applying the product. It is prohibited to wash the application equipment in rivers and ponds and other water bodies. It is prohibited to use in areas where natural enemies such as trichogrammatids are released. 3) Appropriate safety precautions should be taken when using this product. Wear boots, long-sleeved clothes and long pants, wear protective gloves, masks, etc. to avoid skin contact and oral and nasal inhalation. Do not smoke, drink water or eat during use. After use, wash hands, face and other exposed areas with plenty of water and soap and change clothes. 4) Used containers should be properly disposed of and cannot be used for other purposes or discarded at will. 5) It is recommended to rotate the use of acaricides with different mechanisms of action to delay the development of resistance. 6) Children, pregnant women and breastfeeding women are prohibited from contact. It is prohibited for allergic people. Please consult a doctor in time if you have any adverse reactions during use.

إجراءات إسعافات أولية عند التسمم:
إجراءات إسعافات أولية: يجب في حال الشعور أثناء او بعد الاستخدام بعدم الارتياح إيقاف العمل فوراً، اتباع إجراءات إسعافات أولية والذهاب للمستشفى مصطحبا نشرة أو ملصق المبيد. عند ملامسة البشرة: خلع الملابس الملوثة فوراً، إزالة المبيد بقطعة قماش ليثة وغسل المنطقة الملوثة بكمية كبيرة من الماء والصابون. عند ملامسة العين: يجب رفع جفون العين إلى أعلى فورا وغسل العين بماء نقي لمدة 15 دقيقة كحد أدنى. الاستنشاق: مغادرة موقع رش المبيد فوراً والانتقال لمكان هواء نقي. في حال البلع العرضي، يجب التوقف عن أخذ المبيد وعدم الحث على التقيؤ وغسل الفم بعناية بالماء والذهاب فوراً للمستشفى مصطحبا نشرة أو ملصق المبيد. لا يوجد هنالك ترياق (مقاوم لمس) محدد، لذلك نوصي بعلاج الأعراض

First aid measures for poisoning:
First aid measures: If you feel unwell during or after use, stop working immediately, take first aid measures, and go to the hospital with the label. Skin contact: Take off contaminated clothing immediately, remove the contaminated pesticide with a soft cloth, and rinse with plenty of water and soap. Eye contact: Immediately lift the eyelids and rinse with running water for at least 15 minutes. Inhalation: Immediately leave the spraying site and move to a place with fresh air. In case of accidental ingestion: Stop taking the product, do not induce vomiting, rinse your mouth thoroughly with water, and immediately go to the hospital with the pesticide label. There is no specific antidote, so symptomatic treatment is recommended.

تاريخ الإنتاج :
تاريخ الانتهاء :
رقم التشغيل :

Production Date :
Expiry Date :
Batch No :

تورك... TORQUE...

مُرَكِّز مُعَلِّق اس سي SUSPENSION CONCENTRATE (SC)



المكونات : إيتوكسازول المادة الخاملة المجموع	Content : Etoxazole Inert Total	110 g/L 890 g/L 100%
---	--	----------------------------

Manufacturer: Jiangsu Futian Agro-Chemical Co., Ltd.
الشركة المصنعة : شركة جيانغ سو فتيان الزراعية-الكيمائية المحدودة

رقم التسجيل في مؤسسة الامارات للدواء : EDE RG NO AUD-AD-140-3107128

الوكيل الحصري : شركة الجوري للمواد الزراعية
AL JOURI AGRICULTURAL MATERIALS

العين - شارع خليفة Al Ain - Khalefa Street
Showroom. +97137666544 Office.037666466, Mob. 506636891
Email, aljouriuae@gmail.com Web: www.aljouriamc.com

وزن العبوة: 1000 مل
Net weight: 1000 ml

تورك:
يعتبر إيتوكسازول مبيد عناكب يعمل من خلال منع تصنيع ما يعرف بالكيتين وبالملازمة ويمنع العث والعناكب من طرح غلاظها الخارجي. يمكن استخدامه لمكافحة سوس العناكب الحمراء في أشجار الحمضيات.

Torque:
Etoxazole is a chitin synthesis inhibitor and contact acaricide that inhibits mites and aphids from molting. It can be used to control red spider mites in citrus trees.

نطاق والسيب الاستخدام:

المحاصيل	اسم الآفات المضرّة	الجرعة والفترة	الأساليب	فترة
المطاط	عنكبوت احمر ذو نطنتين (Tetranychus Urticae)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	3 أيام
الخيار	عنكبوت احمر ذو نطنتين (Tetranychus Urticae)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	3 أيام
الفلو (بوت حمية)	عنكبوت احمر ذو نطنتين (Tetranychus Urticae)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	3 أيام
بطيخ	عنكبوت احمر (Tetranychus cinnabarinus)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	3 أيام
حمضيات	عنكبوت احمر (Tetranychus cinnabarinus)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	21 يوم
اشجار نخيل	عنكبوت الخبار (Dermatophagoides pteronyssinus) عنكبوت احمر (Tetranychus cinnabarinus)	35 مل/100 لتر ماء بيض، يرقة، حورية	رش	14 يوم

Scope and method of application:					
Crops	Harmful organism name	Dosage and period	Methods of application	PHI	
Tomato	Two-point red spider (Tetranychus Urticae)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	3 days	
Cucumber	Two-point red spider (Tetranychus Urticae)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	3 days	
Pepper (Greenhouse)	Two-point red spider (Tetranychus Urticae)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	3 days	
Watermelon	Red Spider (Tetranychus cinnabarinus)	25 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	3 days	
Citrus	Red Spider (Tetranychus cinnabarinus)	25 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	21days	
Palm tree	Dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) Red Spider (Tetranychus cinnabarinus)	35 ml/100 liter of water Egg, Larva, Nymphal.	Spraying	14 days	

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
أساليب تخزين ونقل:

يجب تخزين هذا المبيد في مستودع جيد التهوية وجاف، بعيداً عن مصادر النيران والحرارة. يجب عند التخزين والنقل تجنب الرطوبة وأشعة الشمس. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص من غير ذوي العلاقة والحيوانات والإبقاء على المبيد مغلقاً بإحكام. يمنع خلطه او نقله مع الأطعمة والبذور والمواد الغذائية.

Storage and transportation methods:

This product should be stored in a ventilated and dry warehouse. Keep away from fire and heat. When storing and transporting, prevent moisture and sunlight. Keep out of reach of children, unrelated personnel and animals, and keep it locked. Do not mix and transport with food, seeds and feed.

بدا المنشأ: الصين Origin : China

